

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

**टीकाकरण
तालिका**

unicef



गर्भवती महिला को
गर्भ की प्रारंभिक अवस्था में
टी.टी. 1





टेटनस से बचाव के लिए


गर्भवती महिला को
टी.टी. 1 के एक महीने बाद
टी.टी. 2




टेटनस से बचाव के लिए



गर्भवती महिला को
अगर पहली गर्भावस्था में टी.टी. के
दो टीके ले लिए गये हों और दूसरी
गर्भावस्था यदि तीन साल के अंदर हो
तब सिर्फ एक



टी.टी. बूस्टर
टेटनस से बचाव के लिए



गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीके
बुखार हो सकता है, जो बिल्कुल सामान्य

बात है।

टीके लगवाकर बच्चों को कई खतरनाक
बीमारियों से बचाया जा सकता है। जिस

जरूरी है, वरना हो सकता है कि टीके
बच्चे को टीके नहीं लगे हों उसके बीमार
पड़ने, हमेशा के लिए अक्षम हो जाने या

कुपोषित हो जाने और उसके मर जाने का

डर अधिक रहता है।

हाँ, टेटनस का पहला टीका गर्भावस्था के
पता चलते ही लगाया जाना चाहिए। दूसरा
टीका पहले टीके के एक महीने बाद

लगेगा।

यदि किसी बच्चे को टीकाकरण तालिका
के अनुसार अगला टीका देने में देरी हो

जाती है तो क्या उस बच्चे को फिर से

सभी टीके लगेंगे?

नहीं, यदि बच्चे को अगले टीके के लिए

लाने में देरी हो गई है तो भी टीकाकरण

फिर से शुरू करने की आवश्यकता नहीं है।

वहाँ से शुरू किया जा सकता है जिस टीके

में देरी हुई है।

यदि किसी एक से पाँच वर्ष के बच्चे को

पहले से एक भी टीका न लगा हो तो उसे

टीके दिये जा सकते हैं?


हाँ, ऐसे बच्चे को भी टीके दिये जा सकते

हैं। ए.एन.एम. दीदी को यह पता है कि इसे

कौन-कौन से टीके दिये जायेंगे।



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



**टीकाकरण
तालिका**

unicef